

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ USG

RODZAJ BADANIA USG		WIEK PACJENTA		
		Noworodki i niemowlęta	Małe dzieci (do 1 - 5 r.ż.)	Dzieci starsze i dorośli
USG jamy brzusznej	ogólne (w tym badanie dopplerowskie tętnic i żył nerkowych)	Bez przygotowania. Wskazane wcześniejsze nakarmienie lub napojenie dziecka	Co najmniej 2 godziny od ostatniego posiłku. Można napić przed badaniem	4 - 6 godzin bez jedzenia; w miarę możliwości pełny pęcherz
	układu moczowego	Napić dziecko (lub nakarmić) ok. 30 min przed badaniem	Wskazane wypicie 100-300 ml niegazowanego płynu na 30-60 min przed badaniem (nie opróżniać pęcherza !)	4 - 6 godzin bez jedzenia; wskazane wypicie 2-4 szklanek niegazowanego płynu na 1-2 godziny przed badaniem (nie opróżniać pęcherza !)
	w kierunku refluksu żołądkowo-przetykowego (OŻP, GER)	Badanie bezpośrednio po nakarmieniu/napojeniu dziecka		
USG narządu rodnego (miednicy małej), przez powłoki j.brzusznej (TA)		Wymagany pełny pęcherz ! Badanie 20-30 min po karmieniu. Może być konieczne dopajanie dziecka w trakcie badania.	Wymagany pełny pęcherz ! Badanie po ok. 1 godz od wypicia płynu (100 - 300 ml w zależności od wieku)	Wymagany pełny pęcherz ! Badanie po ok. 1-2 godz od wypicia płynu (0,3 - 1,0 litr w zależności od wieku)

Badanie głowy (p/ciemieniowe), tarczycy, tkanek miękkich, stawów (biodrowych i innych), dopplerowskie tętnic szyjnych - nie wymagają przygotowania